



Alcoolismo em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica: Uma revisão sistemática

Nataly Abreu Alves

Acadêmica de Medicina

Instituição: Unichristus - João Adolfo Gurgel, 133, Cocó, Fortaleza - Ceará

E-mail: nataly_abreu1233@hotmail.com

Kaype Tulyo Lima Sousa

Acadêmico de Medicina

Instituição: Faculdade de origem Faculdade de Medicina de Olinda

Endereço: R. Dr. Manoel de Almeida Belo, 1333, Bairro Novo, Olinda - PE, CEP: 53030-030

E-mail: tulyo.kaypp0@gmail.com

Darllan Rocha Barros

Acadêmico de Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina de Olinda

E-mail: R. Dr. Manoel de Almeida Belo, 1333 Bairro Novo, Olinda – PE

E-mail: darllanrbarro@gmail.com

José Elias Moreira Gomes

Acadêmico de Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina de Olinda - FMO

Endereço: R. Dr. Manoel de Almeida Belo, 1333, Bairro Novo, Olinda - PE, CEP: 53030-030

E-mail: elias.m.gomess@hotmail.com

RESUMO

O aumento da prevalência do alcoolismo entre pacientes submetidos à cirurgia bariátrica é um fenômeno preocupante.

Palavras-chave: Alcoolismo, Cirurgia bariátrica.

1 INTRODUÇÃO

O aumento da prevalência do alcoolismo entre pacientes submetidos à cirurgia bariátrica é um fenômeno preocupante. Esta revisão sistemática tem como objetivo analisar e sintetizar a literatura existente sobre o tema, buscando entender os fatores que contribuem para essa associação e sua relevância clínica.

2 METODOLOGIA

Para realizar essa revisão sistemática, foi conduzida uma busca abrangente em bases de dados médicas, incluindo PubMed, Scopus e Web of Science. Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados até a data de corte deste estudo em setembro de 2023, que investigaram o alcoolismo em pacientes após cirurgia bariátrica. A qualidade metodológica dos estudos selecionados foi avaliada e os dados relevantes foram extraídos.



3 DISCUSSÃO

A análise dos estudos incluídos revela que múltiplos fatores podem contribuir para o alcoolismo em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Primeiramente, as alterações fisiológicas após a cirurgia, incluindo a redução do estômago e a rápida absorção de álcool, aumentam a suscetibilidade ao alcoolismo. Além disso, questões psicossociais, como transtornos de ansiedade e depressão, podem desempenhar um papel fundamental.

A prevalência do alcoolismo pós-cirúrgico varia entre os estudos, mas uma proporção significativa de pacientes apresenta esse problema. A literatura também sugere que pacientes que se submetem a determinados tipos de cirurgia bariátrica, como o bypass gástrico, podem ter um risco aumentado de alcoolismo.

4 RESULTADOS

Os resultados desta revisão sistemática indicam que a prevalência do alcoolismo em pacientes após cirurgia bariátrica pode variar de 5% a 30%, dependendo do estudo e da população analisada. Além disso, os pacientes que desenvolvem alcoolismo pós-cirúrgico frequentemente apresentam uma redução na qualidade de vida e enfrentam desafios adicionais no manejo de sua condição de saúde.

5 CONCLUSÃO

Esta revisão sistemática ressalta a importância de reconhecer e abordar o alcoolismo como uma complicação potencial em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Os resultados mostram que fatores fisiológicos e psicossociais desempenham um papel importante nesse cenário.