



A Cardiomiopatia de Takotsubo

Nataly Abreu Alves

Acadêmica de Medicina

Instituição: Unichristus - João Adolfo Gurgel 133, Cocó, Fortaleza - Ceará

E-mail: nataly_abreu1233@hotmail.com

Kaype Tulyo Lima Sousa

Acadêmico de Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina de Olinda

Endereço: R. Dr. Manoel de Almeida Belo, 1333 - Bairro Novo, Olinda - PE, CEP: 53030-030

E-mail: tulyo.kaypp0@gmail.com

Darllan Rocha Barros

Acadêmico de Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina de Olinda

Endereço: R. Dr. Manoel de Almeida Belo, 1333 Bairro Novo, Olinda – PE

E-mail: darllanrbarro@gmail.com

José Elias Moreira Gomes

Acadêmico de Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina de Olinda - FMO

Endereço: R. Dr. Manoel de Almeida Belo, 1333 - Bairro Novo, Olinda - PE, CEP: 53030-030

E-mail: elias.m.gomess@hotmail.com

RESUMO

A Cardiomiopatia de Takotsubo, também conhecida como síndrome do coração partido, é uma condição cardíaca rara que pode mimetizar um infarto agudo do miocárdio, mas é caracterizada por uma disfunção temporária do músculo cardíaco, geralmente após um evento estressante.

Palavras-chave: Cardiomiopatia de Takotsubo, Síndrome do coração partido.

1 INTRODUÇÃO

A Cardiomiopatia de Takotsubo, também conhecida como síndrome do coração partido, é uma condição cardíaca rara que pode mimetizar um infarto agudo do miocárdio, mas é caracterizada por uma disfunção temporária do músculo cardíaco, geralmente após um evento estressante. Esta revisão visa analisar os principais fatores de risco associados a essa condição para uma melhor compreensão e identificação precoce.

2 METODOLOGIA

Para realizar esta revisão, foram pesquisadas bases de dados médicas, incluindo PubMed, Scopus e Web of Science, em busca de estudos que investigaram os fatores de risco da Cardiomiopatia de Takotsubo.



A data de corte desta revisão é setembro de 2023. Os critérios de inclusão abrangeram estudos epidemiológicos, revisões e pesquisas clínicas relacionadas ao tema.

3 DISCUSSÃO

Os estudos incluídos nesta revisão sistemática apontam para uma série de fatores de risco associados à Cardiomiopatia de Takotsubo. Um dos principais fatores é o gênero feminino, uma vez que a maioria dos casos ocorre em mulheres pós-menopausadas. Além disso, eventos emocionais ou físicos estressantes, como luto, separação, acidentes, cirurgia e doenças graves, estão frequentemente relacionados ao desencadeamento da síndrome.

Outros fatores de risco incluem uma história prévia de transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, bem como o uso de certos medicamentos, como agentes simpaticomiméticos. Além disso, a presença de condições médicas subjacentes, como hipertensão arterial e doença arterial coronariana, também pode aumentar o risco de desenvolver Cardiomiopatia de Takotsubo.

4 RESULTADOS

Os resultados desta revisão sistemática revelam que os principais fatores de risco da Cardiomiopatia de Takotsubo são:

1. Gênero feminino, com uma incidência significativamente maior em mulheres pós-menopausadas.
2. Eventos emocionais ou físicos estressantes como gatilhos frequentes.
3. História de transtornos psicológicos, particularmente depressão e ansiedade.
4. Uso de medicamentos que afetam o sistema nervoso simpático.
5. Presença de condições médicas subjacentes, como hipertensão e doença arterial coronariana.

5 CONCLUSÃO

Esta revisão enfatiza a importância de identificar e compreender os fatores de risco da Cardiomiopatia de Takotsubo, uma condição que pode imitar um infarto agudo do miocárdio. O reconhecimento precoce desses fatores de risco pode ajudar os profissionais de saúde a avaliar pacientes em situações de estresse agudo e tomar medidas preventivas adequadas.